

OPVOLGING ANTICO-THERAPIE MET VITAMINE K ANTAGONISTEN

THERAPEUTISCHE INR WAARDEN

Indicatie	Therapeutische zone	Streefwaarde
Preventie trombose, VK-fibrillatie, kleplijden biologische klep	2,0 - 3,0	2,5
Igv onvoldoende respons bij diepe veneuze trombose en longembolie	2,5 - 3,5	3,0
Mechanische klepprothese 2de gen. (1ste gen.)	2,5 - 3,5 (2,5 - 4,0)	3,0 (3,0 - 3,5)

Maatschappelijke zetel en vestiging:
Centrum voor Medische Analyse
Oud-strijderslaan 199, 2200 Herentals
tel. 014 28 50 00 - fax 014 22 56 08
www.cma.be - info@cma.be

Vestiging Hasselt:
Centraal Laboratorium Hasselt,
Elfde Liniestraat 27, 3500 Hasselt
tel. 011 22 52 88 - fax 011 24 32 91
infochl@cma.be

BELANGRIJK

1. Bewaar dit document bij uw identiteitskaart en toon het aan elke arts die geraadpleegd wordt en aan uw tandarts.
2. Neem het geneesmiddel steeds op hetzelfde uur en wijzig de dosis niet zonder advies van uw arts.
3. Tal van geneesmiddelen beïnvloeden de werking van de anticoagulantia (o.m. pijnstillers, slaapmiddelen en tranquilizers, sommige antibiotica, anti-epileptica, antihistaminica, vetverlagende medicatie, ...); ook alcohol of bepaalde voeding (lever, grote hoeveelheden vetstoffen, rauwe groenten zoals spinazie, tomaat, sla, broccoli, sperziebonen, kool, bloemkool) en/of voedings- en vitaminesupplementen.
Verwittig uw arts indien er zich ingrijpende wijzigingen zouden voordoen in uw voedingsgewoonten. Wijzig andere medicatie niet zonder uw arts te raadplegen.
4. Verwittig onmiddellijk uw arts of de arts van wacht bij onverwachte bloedingen (blauwe vlekjes, onderhuidse bloedingen, gewrichtsbloedingen, neus- en tandvleesbloedingen, rode urine, bloed bij de stoelgang of ongewoon zwarte stoelgang, ...) en bij veranderingen in de algemene gezondheids-toestand (braakneigingen, koorts, diarree,...)

Naam:

Voornaam:

Echtgeno(o)t(e):

Adres:

Gemeente:

Tel.:

GSM:

HUISARTS:

Dr.:

Adres:

Tel./GSM:

MEDICATIE:

.....
.....
.....

